



адвантейдж®

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению препарата Адвантейдж® для лечения и профилактики энтомозов у собак, кошек и декоративных кроликов
(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH», Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)
Номер регистрационного удостоверения 276-3-2.18-4046№ПВИ-3-0.2/01184

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Адвантейдж® (Advantage®).
Международное непатентованное наименование: имидаклоприд.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Адвантейдж® в 1 мл в качестве действующего вещества содержит имидаклоприд – 100 мг, а также вспомогательные вещества: бензиловый спирт, пропилен карбонат и бутилгидрокситолуол.
3. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства.
Запрещается применение препарата Адвантейдж® по истечении срока годности.
4. Адвантейдж® выпускают в форме раствора (spot-on), расфасованным по 0,4; 0,8; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полимерные пипетки, упакованные по 1 и 4 штуки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят Адвантейдж® в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.
6. Адвантейдж® следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Адвантейдж® относится к инсектицидным препаратам группы хлороникотиниловых инсектицидов.
10. Имидаклоприд [1-(6-хлор-3-пиредилметил) - N-нитро-имидазолидин-2], входящий в состав препарата, обладает выраженным инсектицидным и ларвицидным действием на блох, вшей, власоедов, паразитирующих на собаках и кошках.
Механизм действия имидаклоприда основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что вызывает гибель насекомых.
После нанесения препарата на кожу имидаклоприд постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах животного, оказывая длительное (до 4-х недель) контактное инсектицидное действие.
Адвантейдж® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при нанесении на кожу не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

III. Порядок применения

11. Адвантейдж® применяют для уничтожения насекомых (блох, вшей, власоедов), паразитирующих на собаках, кошках и декоративных кроликах.
12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Адвантейдж® не разрешается применять щенкам моложе 8-недельного возраста, а также котят и декоративным кроликам моложе 10-недельного возраста.
13. При работе с препаратом Адвантейдж® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.
14. Обработку беременных и кормящих самок при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.
15. Адвантейдж® применяют животным однократно путем капельного («spot-on») нанесения на сухую, неповрежденную кожу. Перед использованием с пипетки снимают защитный колпачок и, расположив ее вертикально, прокалывают защитную мембрану

86109840

носика пипетки (надев колпачок с обратной стороны), затем колпачок снова снимают. Препарат, раздвинув шерсть, наносят животному, в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи.

В зависимости от вида и массы животного используют Адвантейдж® различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Вид и масса животного	Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл	Доза имидаклоприда, мг/кг массы животного
Собаки:		
до 4 кг	0,4	10
4–10 кг	1,0	10–25
10–25 кг	2,5	10–25
25–40 кг	4,0	10–16
Кошки:		
до 4 кг	0,4	10
4–8 кг	0,8	10–20
Декоративные кролики:		
до 4 кг	0,4	10
4–8 кг	0,8	10–20

При обработке собак массой более 40 кг, кошек и декоративных кроликов массой более 8 кг используют комбинации пипеток различной фасовки из расчета 0,1 мл/кг.

При обработке крупных собак содержимое пипетки наносят на кожу в 3-4 места вдоль спины, от холки до хвоста.

Гибель паразитирующих на животном насекомых происходит в течение 12 часов. Защитное действие препарата после однократной обработки животного продолжается до 4 недель. Повторные обработки животных на протяжении сезона активности паразитов проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в 28 дней.

При терапии аллергического дерматита, вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с лекарственными средствами патогенетической и симптоматической терапии.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях после применения препарата у животных возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят в течение 1–4 дней и не требуют применения лекарственных средств. Слизывание препарата может вызвать повышенную саливацию у животного, так как препарат имеет горький вкус, что не является признаком отравления и самопроизвольно проходит через несколько минут. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.
17. При передозировке препарата у некоторых животных может наблюдаться угнетенное состояние, расширение зрачков, повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.
18. Не следует применять Адвантейдж® одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.
19. Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.
20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности.
21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным. Запрещается применение препарата Адвантейдж® кроликам, мясу которых предназначено в пищу людям.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «БАЙЕР»
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул., 18, стр. 2;
тел. (495) 234-2000

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Адвантейдж®, утвержденная Россельхознадзором 22.09.2016 года.

