

Инструкция

по применению ветеринарного препарата «Фенантел»

Общие сведения

Препарат представляет собой двояковыпуклую таблетку круглой формы с крестообразной разделительной бороздкой на поверхности, от кремово-серого до серо-желтого цвета.

В одной таблетке препарата содержится 50 мг празиквантела и 500 мг фенбендазола.

Фенантел выпускают в блистерах по 6, 10, 12 и 24 таблетки.

Препарат хранят в упаковке изготовителя, по списку Б, в сухом месте, при температуре от 0 до плюс 20 0С.

Срок годности препарата 4 (четыре) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Фармакологические свойства

Комбинация празиквантела, пирантела памоата и фенбендазола, входящих в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия на все стадии развития круглых и ленточных червей, в том числе: *Toxascara canis*, *Toxaascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus multilocularis*, *Dypilidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp.

Механизм действия празиквантела заключается в увеличении концентрации внутриклеточного кальция, что вызывает усиление сократительной активности мускулатуры плоских гельминтов, затем паралич и гибель паразита.

Пирантела памоат, входящий в состав таблеток обладает Н-холиномиметическим действием в ганглиях, что приводит к активному сокращению мускулатуры нематод, а затем к параличу и гибели гельминта.

Фенбендазол – нарушает синтез белка тубулина, угнетает в митохондриях гельминтов активности фумарат-редуктазы, в результате чего ухудшается усвоение глюкозы и производство АТФ, а также изменяется проницаемости клеточных мембран паразитов.

Препарат малотоксичен, не обладает сенсibiliзирующими и тератогенными свойствами.

Порядок применения препарата

Фенантел применяют для профилактической и терапевтической дегельминтизации кошек (взрослых животных и котят), и собак (взрослых животных и щенков) всех пород при нематодозах (токсокароз, токсаскариоз, унцинароз, анкилостомоз) и цестодозах (тениоз, эхинококкоз, дипилидиоз, дифилоботриоз, мезоцестоидоз) и др.

Препарат задают внутрь, однократно в дозе из расчета 1 таблетка на 10 кг массы собаки (таблица 1).

Препарат задают в утреннее кормление с небольшим количеством корма (с куском мяса, с кашей или мясным фаршем) или вводят принудительно: таблетку помещают на корень языка или вводят в виде водной суспензии с помощью шприца (предварительно смешав препарат с водой).

Масса животного	Доза
До 2,0 кг	1/4 таблетки
1- 5 кг	½ таблетки
5-10 кг	1 таблетка
10-20 кг	2 таблетки
30-40 кг	4 таблетки
Свыше 40 кг	5 таблеток

Препарат задают в утреннее кормление с небольшим количеством корма (с куском мяса, с кашей или мясным фаршем) или вводят принудительно: таблетку помещают на корень языка или вводят в виде водной суспензии с помощью шприца (предварительно смешав препарат с водой).

Фенантел можно применять с 3-х недельного возраста щенкам и котят.

Предварительной диеты или соблюдения голодного режима, а также применения слабительных средств не требуется.

В случае сильной инвазии лечение повторить через 14 суток.

При аскаридной инвазии дегельминтизацию следует повторить через 2-3 недели.

С профилактической целью дегельминтизацию животных проводят ежеквартально, а также перед вакцинацией (не менее чем за 10-14 дней) и перед вязкой.

Для профилактики гельминтозов препарат назначают в лечебной дозе за пять дней до вязки.

В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.

Препарат не следует применять животным в первые двадцать дней беременности.

У беременных и кормящих самок следует не превышать указанную дозировку.

При передозировке препарата и при повышенной индивидуальной чувствительности у животных может отмечаться тошнота, рвота, понос, угнетение, иногда возбуждение.

При возникновении вышеуказанных побочных явлений применяют 0,1%-ый раствор атропина сульфата, подкожно, в дозе 0,05 мл/кг массы животного 2-3 раза в сутки и средства симптоматической терапии.

Полное наименование производителя

ООО «ЭкоВетКом».

+375(17)398-60-82.

Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Октябрьская 157 Д.