



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Масло камфорное 10 %

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс»,
610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.)

Номер регистрационного удостоверения:
24-3-7.19-4471 №ПВР-3-1.9/00278

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Масло камфорное 10 % (Oleum camphoratum 10 %).
Группировочное наименование: камфора.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Масло камфорное 10 % в 100 мл в качестве действующего вещества содержит камфору - 10 г и вспомогательное вещество масло подсолнечное.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость желтого цвета с запахом камфоры.
Срок годности Масла камфорного 10 % в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства.
Запрещается применять Масло камфорное 10 % после окончания срока годности.
4. Выпускают Масло камфорное 10 % расфасованным по 100, 230 мл в полимерные флаконы, закрытые полимерными навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия.
Каждую единицу фасовки сопровождают инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.
6. Масло камфорное 10 % следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача

II. Фармакологические свойства

9. Масло камфорное 10 % относится к фармакотерапевтической группе - местно-раздражающие средства.
10. Масло камфорное 10 % оказывает антисептическое, местное раздражающее, местное анальгезирующее, противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию в области нанесения. При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюконовой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.
По степени воздействия на организм Масло камфорное 10 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Масло камфорное 10 % применяют животным для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритов, бурситов, миозитов, тендовагинитов, ушибов) и субклинического мастита у коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению Масла камфорного 10 % являются нарушения целостности кожного покрова и индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При применении Масла камфорного 10 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Маслом камфорным 10 %. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их следует промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также новорожденным животным определяет лечащий врач на основании оценки соотношения пользы и возможного риска его применения.

15. Масло камфорное 10 % назначают наружно в виде растираний. Масло наносят тонким слоем на участок кожи в области воспалительного процесса и легкими массирующими движениями втирают в течение 2–3 минут 1–2 раза в сутки на протяжении 7–10 дней в зависимости от тяжести заболевания.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Масла камфорного 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его применение прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Масло камфорное 10 % не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения аналогичного назначения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

21. Не рекомендуется применение Масла камфорного 10 % перед убоем.

Продукты животноводства, в том числе молоко, можно использовать без ограничений через 48 часов после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, используют после кипячения на корм пушным зверям. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо и субпродукты используют на корм зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Генеральный директор
ЗАО «НПП «Фармакс»



И.В. Раджапова