

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Е.А. НЕПОКЛОНОВ

15 ОКТ 2014

ИНСТРУКЦИЯ
по применению РольфКлуб 3D капль для кошек
для борьбы с эктопаразитами

(Организация-разработчик: Veterinary Bio GmbH, Германия)

1. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: РольфКлуб 3D капль для кошек (RolfClub 3D drops for cats).

Международное непатентованное наименование: фипронил, этофенпрокс и пирипроксифен.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

РольфКлуб 3D капль для кошек содержат в качестве действующих веществ фипронил – 9,8%, этофенпрокс – 15%, пирипроксифен – 2%, а в качестве вспомогательных веществ изопропиловый спирт – 20%, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир (ДЭМЭ) – 15%, твин-80 – 2%, бутилгидроксианизол (БГА) 0,2%, бутилгидрокситолуол (БГТ) – 0,1%, полиэтиленгликоль (ПЭГ 400) до 100%. Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость светло-желтого цвета.

3. Выпускают РольфКлуб 3D капль для кошек расфасованные в полимерные тубик-пипетки объемом 0,5 и 0,8 мл, упакованные в блистерные упаковки вместе с инструкцией по применению.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

РольфКлуб 3D капль для кошек по истечении срока годности не должны применяться.

4. Хранят РольфКлуб 3D капль для кошек в упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2⁰С до 25⁰С и относительной влажности не более 60 %.

5. РольфКлуб 3D капль для кошек следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. РольфКлуб 3D капли для кошек относятся к группе инсектоакарицидных препаратов. Фипронил, этофенпрокс и пирипроксифен, входящие в состав препарата, оказывают контактное инсектоакарицидное действие на половозрелых и неполовозрелых (личинки) фаз развития блох, власоедов, нотоэдрозных, отодекозных и иксодовых клещей, паразитирующих на кошках, а также обеспечивает защиту животных от кровососущих летающих насекомых (комаров, мошек и москитов). Препарат Рольф клуб 3D капли для кошек обладает выраженным нокдаун-эффектом, время наступления состояния нокдауна составляет около 2-х минут, что препятствует присасыванию (укусу) клещей и насекомых при нападении. Оказывает репеллентное действие на кровососущих летающих насекомых.

Механизм действия фипронила заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых рецепторах эктопаразита, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели членистоногих.

Механизм действия этофенпрокса заключается в блокировании передачи нервных импульсов насекомых, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов, возникающий при первом контакте с шерстью обработанного животного. Этофенпрокс обладает быстрым нокдаун-эффектом на насекомых и иксодовых клещей, возникающий при первом контакте с шерстью обработанного животного.

Механизм действия пирипроксифена заключается в нарушении процессов синтеза хитина и линьки личинок, препятствует развитию полноценных куколок и вызывает гибель насекомых на преимагинальных фазах развития, что приводит к прекращению восполнения популяции эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожу его активные компоненты равномерно распределяются по поверхности тела, не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах животного и оказывают длительное инсектоакарицидное действие и защиту животного от насекомых и клещей.

РольфКлуб 3D капли для кошек по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладают местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием. Препарат токсичен для кроликов, пчел, рыб и других гидробионтов, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

III. Порядок применения

8. РольфКлуб 3D капли для кошек применяют кошкам и котятм старше 12-недельного возраста при энтомозах (блохи, власоеды), отодектозе, нотоэдрозе, поражении иксодовыми клещами, для защиты животных от нападения летающих кровососущих насекомых.

9. Противопоказанием к применению РольфКлуб 3D капель для кошек является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, кормящие и беременные самки, котята

моложе 12-недельного возраста. Запрещено применять препарат другим видам животных.

10. РольфКлуб 3D капли для кошек применяют кошкам однократно путем точечного («spot on») нанесения на кожу. Кончик тюбик-пипетки предварительно отрезают ножницами. Лекарственный препарат, раздвинув шерсть, наносят на сухую неповрежденную кожу в области шеи у основания черепа или между лопатками (в места, недоступные для слизывания) в дозах, указанных в таблице:

Масса животного, кг	Доза препарата, мл
до 4	0,5
свыше 4	0,8

При обработке крупных кошек (свыше 8 кг) РольфКлуб 3D капли для кошек дозируют из расчета 0,125 мл/кг.

В случае наличия присосавшихся клещей и паразитирующих насекомых, открепление и гибель их наступает в течение 1-2 часа после обработки. Продолжительность защитного действия от иксодовых клещей после однократной обработки сохраняется в течение 30 дней, против насекомых – до 2-х месяцев, репеллентное действие против летающих кровососущих насекомых – в течение 7 суток.

Повторные обработки проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного лекарственный препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

При отодектозе (ушной чесотке) наружный слуховой проход очищают от струпуев и корок, затем закапывают в каждое ухо по 1-3 капли препарата (в зависимости от размера животного). Ушную раковину складывают вдоль пополам и массируют ее основание. Обработку повторяют 2-3 раза с интервалом 5-7 дней. Лекарственный препарат обязательно вводят в оба уха, даже в случае выявления клинических признаков заболевания только в одном ухе.

При нотоэдрозе кошек препарат наносят на пораженные участки и распределяют кончиками пальцев в перчатке с захватом до 1 см здоровой кожи в дозе 0,15 мл/кг. Обработку проводят 2-4-кратно, с интервалом 7-10 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

11. Симптомы, возникающие при передозировке препарата: избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи. В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и при необходимости животному назначают препараты симптоматической терапии.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений режима применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности.

14. Побочных явлений и осложнений при применении препарата РольфКлуб 3D капли для кошек в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к

компонентам препарата, возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих случаях препарат смывают водой с моющим средством и при необходимости животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

16. РольфКлуб 3D капли для кошек не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с РольфКлуб 3D каплями для кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует мыть, гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 48 часов после обработки препаратом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с РольфКлуб 3D каплями для кошек. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «НПФ «Экопром», Московская область, Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11.

Инструкция разработана Veterinary Bio GmbH, Wilhelm-Leuschner Str. 41, Frankfurt am Main, Германия

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению РольфКлуб 3D капель для кошек, утвержденная Россельхознадзором 14.05.2014 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения