

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
протокол от «2» февраля 2024 г. № 134.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного препарата «Цефапик LA»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Цефапик LA (Cefapicum LA).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: цефтиофур.

Лекарственная форма: суспензия для инъекций.

1.2 Цефапик LA представляет собой суспензию белого или кремового цвета.

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг цефтиофура (в форме кристаллической свободной цефтиофуровой кислоты), вспомогательные вещества: миглиол, хлопковое масло, стеариновая кислота, спирт бензиловый.

1.3 Препарат выпускают по 50, 100, 200 мл в стеклянных флаконах из бесцветного стекла и по 100 мл в полимерных флаконах белого цвета.

1.4 Цефапик LA хранят по общему списку при температуре не выше 25 °С.

1.5 Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

После вскрытия флакона препарат необходимо хранить при температуре от 2 °С до 8 °С, использовать в течение 28 дней.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных для детей.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с действующим законодательством.

1.6 Условия отпуска – без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Цефапик LA – антибактериальный препарат из группы цефалоспоринов третьего поколения. Препарат активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая некоторые анаэробные бактерии и штаммы, продуцирующие β -лактамазу, и некоторых анаэробных бактерий: *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Salmonella* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Actinomyces (Trueperella) pyogenes*, *Klebsiella* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp., *Bacillus* spp., *Proteus* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Porphyromonas asaccharolyticus*, *Porphyromonas levii*.

2.2 Цефтиофур обладает антибактериальным действием. Механизм действия заключается в ингибировании фермента транспептидазы и нарушении синтеза пептидогликана – мукопептида клеточной оболочки, что приводит к нарушению роста клеточной стенки микроорганизма и лизису бактерий.

2.3 После введения Цефапик LA быстро резорбируется с места инъекции. Цефтиофур в организме метаболизируется с образованием десфуоилцефтиофура, который оказывает антибактериальное действие.

У свиней максимальная концентрация антибиотика в плазме крови наблюдается через 22 часа после введения препарата и сохраняется не менее 7 суток. Компоненты препарата выделяются из организма главным образом с мочой (около 60 %) и с фекалиями (около 15 %) в течение 10 дней после введения.

У крупного рогатого скота максимальная концентрация препарата в плазме крови достигается через 12 часов после введения препарата и сохраняется на терапевтическом уровне не менее 7 суток. Компоненты препарата выделяются из организма главным образом с мочой (свыше 70 %) и с фекалиями (12-15 %).

2.4 Цефапик LA по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Цефапик LA применяют свиньям с лечебной целью при респираторных инфекциях бактериальной этиологии, септицемии, полиартритах, сальмонеллезе, гемофилезном полисерозите, пастереллезе; крупному рогатому скоту – при респираторных инфекциях бактериальной этиологии, некробактериозе, послеродовом метрите, а также при других болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

Цефалик LA применяют однократно:

– крупному рогатому скоту: подкожно, в дозе 1 мл на 15 кг массы тела животного (6,6 мг цефтиофура на 1 кг массы тела животного).

3.3 Запрещается применять препарат животным при индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, с почечной и/или печеночной недостаточностью.

3.4 Симптомы передозировки препарата не установлены.

3.6 Не рекомендуется применять Цефепим LA совместно с антибактериальными препаратами.

3.7 Убой свиней, крупного рогатого скота на мясо разрешается через 20 суток после введения препарата. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока, мясо может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Молоко продуктивных животных разрешается использовать для пищевых целей без ограничения.

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении неэффективности или несоответствия препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Промветсервис» (юридический адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, 12/2а, тел./факс: +375 17 503 53 67).

Производитель: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская 1/2, тел./факс: +375 1770 27081.

Инструкция подготовлена сотрудниками РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (Высоцкий А.Э.) и ООО "Промветсервис" (Дмитриева А.А.).

на основании данных, внесенных в продолжительного
материала 14, что является частью хозяйства и
предоставления Республики Беларусь
Система ветеринарных препаратов
ОДОБРЕНО
Председатель: _____
Секретарь: _____
Эксперт: _____
09 02 2024. протокол № 134