СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 37 от 29.05.202

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Фортеприл»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Фортеприл (Forteprilum).

Международное непатентованное наименование: беназеприл.

Выпускают в следующих дозировках:

Фортеприл 5 мг;

Фортеприл 20 мг.

1.2 Лекарственная форма: таблетки.

1.3 В 1,0 г препарата содержится 80 мг беназеприла гидрохлорида, а также вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, дрожжи неактивные, целлюлоза микрокристаллическая, натрия лаурилсульфат, поливинилпирролидон, кросповидон, аспасвит Ц200, ароматическая добавка, кальция стеарат, тальк.

В одной таблетке Фортеприл 5 мг и Фортеприл 20 мг содержится соответственно 5 мг и 20 мг беназеприла гидрохлорида.

1.4 По внешнему виду препарат представляет собой плоскоцилиндрические таблетки с риской, от светло-бежевого до коричневого цвета, возможно наличие более темных или белых вкраплений.

1.5 Препарат выпускают расфасованным по 6 или 7 таблеток в блистерах, помещенных по 2 штуки вместе с инструкцией по применению в индивидуальную картонную пачку.

1.6 Препарат хранят в упаковке производителя при температуре от 2 °С до 25 °С. Хранят в недоступном для детей месте, отдельно от продуктов питания и кормов. Препарат транспортируют, соблюдая условия хранения.

1.7 Срок годности– 2 года от даты производства при соблюдении условий хранения и транспортирования. Не применять по истечении срока годности. Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.8 Препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Фортеприл – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

2.2 Беназеприл гидрохлорид в результате гидролиза образует активный метаболит беназеприлат, который ингибирует АПФ. Беназеприлат является частью ренин-ангиотензиновой каскадной системы и предотвращает превращение неактивного ангиотензина 1 в биологически активный ангиотензин 2-гормон, контролирующий вазоконстрикцию и выброс альдостерона, что предотвращает сужение кровеносных сосудов, снижая артериальное давление и облегчая кровообращение у собак. У кошек способствует нормализации повышенного давления в капиллярах клубочков и снижает системное артериальное давление.

Беназеприла гидрохлорид после перорального введения быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта животного, метаболизируется в печени до активного метаболита беназеприлата. Концентрация беназеприлата уменьшается двухфазно: в первую быструю фазу выводится свободный беназеприлат, во вторую терминальную фазу выделяется беназеприлат, связанный с АПФ. Беназеприл и беназеприлат экстенсивно связываются с протеинами плазмы крови, быстро распределяются в тканях, главным образом, в печени и почках. Выводится беназеприлат из организма с желчью и мочой.

2.3 По степени воздействия на организм препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют собакам и кошкам при сердечной недостаточности и при хронической почечной недостаточности.

3.2 Препарат применяют индивидуально перорально один раз в сутки независимо от кормления в дозе 0,25-0,5 мг беназеприла гидрохлорида на 1 кг массы тела животного.

Терапевтическую дозу и продолжительность курса лечения в зависимости от физического состояния животного и течения заболевания определяет лечащий ветеринарный врач. При тяжелом течении заболевания разовая доза препарата может быть увеличена вдвое. Длительность курса лечения не ограничена.

Разовые дозы препарата в зависимости от массы животного и дозировки используемых таблеток представлены в таблице:

Масса тела животного, кг	Фортеприл 5 мг		Фортеприл 20 мг	
	стандартная доза, таблеток	повышенная доза, таблеток	стандартная доза, таблеток	повышенная доза, таблеток
Кошки 2,5 – 5,0	½	1	–	–
Кошки 5,1 – 10,0	1	2	–	–
Собаки 5,1 – 10,0	½	1	–	–
Собаки 10,1 – 20,0	1	2	–	–
Собаки 20,1 – 40,0	–	–	½	1
Собаки 40,1 – 80,0	–	–	1	2

3.3 При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При индивидуальной повышенной чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные и симптоматические препараты.

3.4 При передозировке препарата у животного возможно чрезмерное снижение артериального давления; в этом случае проводят промывание желудка, индуцируют рвоту и назначают внутривенное введение теплого физиологического раствора и средства симптоматической терапии.

3.5 Следует избегать нарушений схемы применения, так как это может привести к снижению эффективности препарата. В случае пропуска одной дозы необходимо возобновить применение препарата в той же дозе и по той же схеме.

3.6 Противопоказанием к применению является повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, стеноз аорты или легочной артерии, гипонатриемия, гипотензия, гиповолемия, острая почечная недостаточность.

3.7 Применение препарата беременным и лактирующим животным при необходимости должно проводиться под контролем лечащего ветеринарного врача.

3.8 Не следует применять препарат одновременно с калийсберегающими диуретическими средствами, блокаторами кальциевых каналов, препаратами, содержащими ионы калия (калия хлорид, калия аспарагинат), нестероидными противовоспалительными, седативными и другими лекарственными средствами, обладающими гипотензивным действием. При необходимости одновременного применения данных групп препаратов нужно следить за функциональным состоянием почек, уровнем калия в крови, обращать внимание на признаки гипотензии (слабость, летаргия и т.д.).

Разрешено применение одновременно с пимобенданом.

3.9 Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения, использование препарата прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения данного препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19 А), для подтверждения соответствия нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Рубикон», 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б. Адрес производственной площадки: Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Терешковой, 13 В.

Инструкция по применению разработана сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Петров В.В., Романова Е.В., Мацинович М.С., Пипкина Т.В., Понаськов М.А., Иванов В.Н.), ООО «Рубикон» (Кукор С.С.).