Стоп – Кокцид 2.5%

Инструкция
по применению лекарственного препарата
для лечения и профилактики кокцидиозов у сельскохозяйственных птиц
(Организация-разработчик: ООО «АПИ-САН»,117437, г. Москва, ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп-кокцид 2,5% (Stop-coccid 2,5%).
Международное непатентованное наименование: толтразурил.
Лекарственная форма: раствор для орального применения.
2. Стоп-кокцид 2,5% в 1 мл в качестве действующего вещества содержит: толтразурил — 25 мг, а в качестве вспомогательных веществ: триэтаноламин и макрогол 400.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость желтого цвета.
4. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 3 года со дня производства, после вскрытия — не более 60 суток. Запрещается применение препарата Стоп-кокцид 2,5% по истечении срока годности.
5. Препарат выпускают расфасованным по 10, 100 мл, 1 л в полимерные флаконы и по 5 л в полимерные канистры с навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы объемом менее 1 л помещают в картонную пачку. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.
6. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.
7. Стоп-кокцид 2,5% следует хранить в местах, недоступных для детей.
8. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
9. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

Фармакологические свойства

Стоп-кокцид 2,5% относится к антикокцидийным препаратам группы триазинтриона.
10. Толтразурил, входящий в состав препарата, обладает широким спектром кокцидиоцидного действия на все стадии внутриклеточного развития (мерогонии и гамогонии) кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, в том числе Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria necatrix, Eimeria mitis, Eimeria adenoides, Eimeria meleagrimitis, Eimeria anceris, Eimeria truncata, включая кокцидий, устойчивых к другим антикокцидийным препаратам. Механизм действия толтразурила заключается в блокировании дыхательных ферментов и оказании повреждающего действия на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий. Толтразурил, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов, вызывает гибель паразита. После перорального введения препарата толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта. Выводится толтразурил из организма птиц в основном в неизмененном виде, а также в виде метаболитов с пометом. Стоп-кокцид 2,5% по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Порядок применения

11. Стоп-кокцид 2,5% применяют цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам, гусям и уткам с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе при достижении в подстилке критического уровня кокцидий (10 - 20 тыс./г), а также при появлении у птиц клинических признаков заболевания.
12. Стоп-кокцид 2,5% не следует применять племенной птице, ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста.
13. При работе со Стоп-кокцидом 2,5% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
14. Препарат не предназначен для применения птицам-несушкам, ввиду накопления препарата в яйцах.
15. Стоп-кокцид 2,5% применяют птице с водой для поения два дня подряд в дозе 7 мг толтразурила (по действующему веществу) на 1 кг массы птицы (28 мл препарата на 100 кг массы птицы), что эквивалентно:
• 1 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице в течение 48 часов подряд или

• 3 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов в сутки два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания курс лечения повторяют через 5 дней. В период применения Стоп-кокцида 2,5% птица должна получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор сохраняет свое действие в течение 48 часов. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно перемешать.

16. При применении препарата Стоп-кокцид 2,5% в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке у птиц могут наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. Стоп-кокцид 2,5% не рекомендуется применять одновременно с другими антикокцидийными препаратами.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение препарата следует возобновить в той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток, индеек, гусей и уток — не ранее чем через 16 суток после последнего применения препарата Стоп-кокцид 2,5%. В случае вынужденного убоя птиц ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

Меры профилактики

При работе со Стоп-кокцидом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. Пустые флаконы и канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп-кокцидом.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-3563-18.