



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

06 ФЕВ 2024

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Азинокс для собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-7.0-4314№ПВР-2-1.2/00898

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Азинокс для собак и кошек (Azinox for dogs and cats);
международное непатентованное наименование: празиквантел.
2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.
Лекарственный препарат в 1 таблетке в качестве действующего вещества содержит празиквантел - 50 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу, крахмал картофельный, вкусовую добавку с ароматом свежего мяса.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой двояковыпуклые таблетки от белого до белого с кремовым оттенком цвета, с риской с одной стороны и логотипом с другой, допускаются темные включения.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – 3 месяца. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.
4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 3 и 6 таблеток в блистеры, упакованные индивидуально в картонную пачку; по 100 и 300 таблеток в полимерные банки, укупоренные полимерной крышкой. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Азинокс для собак и кошек относится к лекарственным препаратам фармакотерапевтической группы – антигельминтные средства.
10. Входящий в состав препарата празиквантел – ацилированное производное пиразинизохинолина, обладает широким спектром цестодоцидного действия на все фазы развития ленточных гельминтов (цестод), паразитирующих у собак и кошек, в том числе *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Mesocestoides* spp., *Taenia* spp., *Dipylidium caninum* и *Diphyllbothrium latum*.

Механизм его действия основан на индуцировании распада тегумента и ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполаризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель цестод и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 30-60 минут, распределяется в органах и тканях животного; связывается с сывороточными белками крови (70-80%), частично метаболизируется в печени, реэскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 24 часов.

Азинокс для собак и кошек по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Азинокс для собак и кошек назначают для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых ленточными гельминтами (дипилидиоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидозы, тениидозы, включая эхинококкоз).

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), выраженные нарушения функции почек и печени. Не подлежат дегельминтизации истощенные и больные инфекционными болезнями животные.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Азинокс для собак и кошек.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Дегельминтизацию самок в период беременности и вскармливания потомства при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача за 3 недели до предполагаемых родов и через 2-3 недели после родов. Препарат не следует применять щенкам и котят до 3-недельного возраста.

15. Азинокс для собак и кошек применяют индивидуально, однократно, перорально (внутри) с небольшим количеством корма (лакомством) во время кормления или вводят на корень языка в дозе 1 таблетка на 10 кг массы животного, что соответствует 5 мг/кг празиквантела.

Кошкам и собакам массой менее 5 кг препарат применяют в виде водной суспензии, для приготовления которой $\frac{1}{2}$ таблетки измельчают, суспендируют в 5 мл воды, интенсивно взбалтывают и тотчас вводят животному внутрь с помощью шприца без иглы из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

С лечебной целью собак и кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально в терапевтической дозе.

16. Побочных явлений и осложнений у собак и кошек при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. При значительной передозировке лекарственного препарата у животного может наблюдаться нарушение моторики желудочно-кишечного тракта и угнетенное со-

стояние. В этих случаях животному назначают энтеросорбенты и средства симптоматической терапии.

18. Не следует применять Азинокс для собак и кошек одновременно с лекарственными средствами, содержащими пиперазин и препаратами, ингибирующими холинэстеразу. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормами и известными кормовыми добавками отсутствуют.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлены.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации животных, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дегельминтизации препарат применяют в дозе и по схеме, установленной настоящей инструкцией.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93. Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru