



**Указания по применению
геля «Декорнум»
для предупреждения роста рогов у телят**

А.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Гель «Декорнум» для предупреждения роста рогов у телят представляет собой густую массу от бежевого или светло-розового до серого цвета, возможно наличие включений. Допускается изменение окраски поверхностного слоя.
- 1.2 В состав геля входит: натрия гидроксид, глицерин, вода очищенная и наполнители.
- 1.3 Выпускают в упаковке из полимерных материалов от 50 г до 1 кг.
- 1.4 Гель хранят в упаковке изготовителя в защищенном от света и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С.
- 1.5 Срок годности 2 (два) года от даты изготовления, при соблюдении условий хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 При нанесении на кожу в области роговых зачатков гель вызывает размягчение эпидермиса, разрушение производящего слоя эпидермиса, растворение волосяного покрова. Происходит изменение белков, жиров и углеводов кожи (образуются щелочные альбуминаты, происходит омыление жиров, углеводы разрушаются) вследствие чего меняется не только функциональное состояние кожи, но и ее структура: клетки разбухают, процессы осмоса и диффузии в них прекращаются. Активнодействующие вещества геля легко растворимы в жидкостях организма, поэтому глубоко проникают в ткани, вызывая некроз роговых зачатков.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Гель применяют крупному рогатому скоту (телятам 1-8-ми недельного возраста) для предупреждения развития рогов.
- 3.2 Гель применяют **однократно** наружно (наноса на кожу в области рогового зачатка) в дозе 1,0-2,0 г на кожу в области одного рогового зачатка. Для этого фиксируют животное. Делают нейролептаналгезию, инфильтрационную анестезию области рогового зачатка 0,5 %-ным раствором новокаина. Удаляют волосяной покров в области рогового зачатка. Границу применения геля очерчивают кольцеобразно (диаметр кольца 20-25 мм), используя крем для вымени или вазелин. Наносят гель на кожу роговых зачатков деревянным аппликатором (шпателем).
- 3.3 Гель оказывает остро раздражающее действие.
- 3.4 Животноводческую продукцию после применения геля можно использовать без ограничений.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1 Все работы с гелем необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Открывать и брать емкость с гелем необходимо осторожно. Немедленно снять одежду, если на нее попал гель. При контакте с кожей необходимо немедленно нейтрализовать активнодействующие вещества геля растворами кислот (1%-ная лимонная, 1%-ная уксусная и др.), далее промыть теплой водой. При попадании геля в глаза необходимо промыть их водой. При попадании геля в рот необходимо сполоснуть его водой. В случае необходимости обратиться к врачу.
- 4.2 Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения геля, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения геля в соответствии с указаниями по применению. При подтверждении выявления отрицательного воздействия геля на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А), для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ООО «Рубикон», 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б.

Инструкция по применению геля разработана сотрудниками кафедры общей, частной и оперативной хирургии (Веремеем Э.И., Руколем В.М., Журбой В.А., Локтевым А.П., Кочетковым А.В., Анашкиным Е.Е.) УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины».