




ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
И ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Клавуксидин® таблетки

(Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская область,
городской округ Люберцы, дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом 3А, офис 34)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-14.24-5189№ПВР-3-14.24/03988



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Клавуксидин® таблетки (Clavuxicin tablets).
Международные непатентованные наименования: амоксициллин, клавулановая кислота.
2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.
Клавуксидин® таблетки в качестве действующих веществ содержат амоксициллин в форме тригидрата и клавулановую кислоту в форме клавуланата калия. В качестве вспомогательных веществ в таблетках содержится Лудипресс (лактоза моногидрат – 93%, Коллидон 30 – 3,5%, Коллидон CL – 3,5%), натрия алюмосиликат, кальция стеарат, ароматизатор «Бекон».
Клавуксидин® таблетки выпускают в трех дозировках:
- 50 мг с содержанием 40 мг/табл. амоксициллина и 10 мг/табл. клавулановой кислоты;
- 250 мг с содержанием 200 мг/табл. амоксициллина и 50 мг/табл. клавулановой кислоты;
- 500 мг с содержанием 400 мг/табл. амоксициллина 100 мг/табл. клавулановой кислоты.
3. По внешнему виду препарат представляет собой плоскоцилиндрические таблетки белого или серовато-белого цвета (допускается наличие вкраплений другого оттенка) с риской на одной стороне и логотипом VIC на другой.
Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования – 1 год со дня производства.
Запрещается применять препарат по истечении срока годности.
4. Клавуксидин® таблетки 50 мг выпускают расфасованным по 4 таблетки в блистеры из пленки полиэтиленовой и металлизированной фольги, которые упаковывают индивидуально в пакеты из металлизированной фольги. Фольгированные пакеты по 3 штуки помещают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
Клавуксидин® таблетки 250 мг и 500 мг выпускают расфасованным по 12 таблеток в блистеры из пленки полиэтиленовой и металлизированной фольги, которые упаковывают индивидуально в пакеты из металлизированной фольги. Фольгированные пакеты по 1 штуке помещают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не выше 60%.
6. Клавуксидин® таблетки следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Клавуксидин® таблетки относится к антибактериальным лекарственным препаратам фармакотерапевтической группы пенициллины в комбинации.
10. Амоксициллин – полусинтетический антибиотик группы пенициллина. Механизм антибактериального действия заключается в подавлении функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к гибели бактерий.
Клавулановая кислота инактивирует пенициллиназу пенициллинрезистентных микроорганизмов, и тем самым, восстанавливает чувствительность бактерий к бактерицидному действию амоксициллина в концентрациях, которые легко достигаются в тканях животных после введения препарата.
Комбинация амоксициллина с клавулановой кислотой обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Staphylococcus spp.* (включая штаммы продуцирующие β-лактамазу), *Corynebacterium spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Peptostreptococcus spp.*, *Escherichia coli* (включая штаммы продуцирующие β-лактамазу), *Salmonella spp.* (включая штаммы продуцирующие β-лактамазу), *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Campylobacter spp.*
Амоксициллина тригидрат и клавулановая кислота после перорального введения хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта и проникают в большинство органов и тканей организма. Терапевтические концентрации поддерживаются на протяжении 12 часов. Действующие вещества Клавуксидина® таблеток практически не метаболизируются и выводятся из организма преимущественно с мочой, в меньшей степени с желчью.
Препарат Клавуксидин® таблетки по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Клавуксидин® таблетки применяют для лечения собак и кошек при инфекционных заболеваниях бактериальной этиологии, включая:
- кожные заболевания (в том числе глубокую и поверхностную пиодерму);
- инфекции мочевыводящих путей;
- респираторные инфекции бактериальной этиологии (при вовлечении в инфекционный процесс как верхних, так и нижних дыхательных путей);
- энтериты бактериальной этиологии.
12. Запрещается применять препарат животным с гиперчувствительностью к β-лактамам антибиотикам.
13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.
Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки с мылом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды.
Людям с гиперчувствительностью к компонентам таблеток следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).
Упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.
14. Разрешается применение препарата животным в период беременности и лактации под наблюдением ветеринарного врача.
15. Препарат назначают животным перорально. Клавуксидин® таблетки дают с руки, или в смеси с кормом, или вводят принудительно на корень языка. Прием пищи не влияет на биодоступность действующих веществ препарата. Клавуксидин® таблетки назначают в разовой дозе 12,5 мг (по сумме действующих веществ) на 1 кг массы животного два раза в день. Продолжительность курса лечения 5-7 дней.

Масса животного (кг)	Количество таблеток на 1 животное 2 раза в сутки		
	Клавуксидин® 50 мг	Клавуксидин® 250 мг	Клавуксидин® 500 мг
до 2	½	-	-
3-5	1	-	-
6-9	2	-	-
10-13	3	½	-
14-18	4	-	-
19-25	-	1	½
26-35	-	1½	-
36-50	-	2	1
более 50	-	3	1½

- В случае, если заболевание трудно поддается лечению (респираторные инфекции), следует увеличить дозу препарата до 25 мг/кг массы животного два раза в сутки.
В случае хронических или трудноизлечимых заболеваний, особенно глубокой пиодермии у собак, курс лечения может составлять 10-28 дней.
16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.
 17. Симптомы передозировки не установлены.
 18. Не рекомендуется одновременное назначение препарата Клавуксидин® таблетки с бактериостатическими антибиотиками.
 19. Особностей действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.
 20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности.
В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.
 21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:
ООО «НПФ ВИК», Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Северный, ул. Березовая, д. 3 (полный производственный цикл)

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:
ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская обл., г.о. Люберцы, дачный пос. Красково, Егорьевское ш., д. 3А, офис 34