

Инструкция

по применению ветеринарного препарата «Марбосан-100»

Состав

Состав на 1 мл:

Марбофлоксацин - 100 мг.

Вспомогательные вещества – 1 мл.

Лекарственная форма - Раствор для парентерального введения.

Описание

Марбофлоксацин — это антибиотик, относящийся к группе фторхинолонов и действующий за счет подавления ДНК-гиразы.

Он активен в отношении широкого спектра грамположительных (в частности, *Staphylococci*) и грамотрицательных бактерий (таких как *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter cloacae*, *Serratia marcescens*, *Morganella morganii*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pseudomonas spp.*) и *Mycoplasma spp.*

Показания

Крупный рогатый скот:

Лечение респираторных инфекций, вызванных чувствительными к марбофлоксацину штаммами, такими как *Pasteurella mutocida*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* и *Mycoplasma bovis*. Лечение острого мастита, вызванного штаммами *E. coli*, чувствительными к марбофлоксацину, в период лактации.

Свины:

Лечение синдрома ММА (мастит, метрит, агалактия), (нарушения секреции молока после опороса), вызванного чувствительными штаммами микроорганизмов.

Противопоказания

Нет.

Побочные эффекты

Реакции гиперчувствительность.

Доза

Крупный рогатый скот:

2 мг на 1 кг массы тела в сутки (1 мл на 50 кг массы тела) (внутримышечно, подкожно или внутривенно) один раз в день в течение 3–5 дней или однократно внутримышечно 8 мг на 1 кг массы тела (2 мл на 25 кг массы тела) при респираторных инфекциях.

Свины:

2 мг на 1 кг массы тела в сутки (1 мл на 50 кг массы тела) внутримышечно один раз в день в течение 3 дней.

Период ожидания

Крупный рогатый скот:

- Мясо и субпродукты: 6 дней.
- Молоко (лечение 3–5 дней): 36 ч.
- Молоко (однократно): 72 ч.

Свины:

- Мясо и субпродукты: 4 дня.

Упаковка

По 100 мл во флаконах.