



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Мазь салициловая 2%, 5%, 10%

(Организация-разработчик: АО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д.2)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-2.18-4066№ПВР-3-2.1/00757

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование - Мазь салициловая 2%, 5%, 10% (Unguentum Acidi salicylici 2%, 5%, 10%);

группировочное наименование: салициловая кислота.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь салициловая 2%, 5%, 10% в 100 г в качестве действующего вещества содержит соответственно 2 г, 5 г или 10 г салициловой кислоты, а в качестве вспомогательного вещества вазелин медицинский или вазелин ветеринарный.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой мазь белого или светло-желтого цвета.

Срок годности Мази салициловой 2%, 5%, 10% при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 4 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.

4. Мазь салициловую 2%, 5%, 10% выпускают расфасованной по 10; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 130; 140; 150; 160; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550 г и 1,0 кг в соответствующей вместимости банки стеклянные с навинчивающимися крышками или в банки полимерные с крышкой с контролем первого вскрытия, или в тубы полимерные. Каждая потребительская упаковка снабжена инструкцией по применению.

5. Хранят Мазь салициловую 2%, 5%, 10% в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5⁰С до 30⁰С.

6. Мазь салициловую 2%, 5%, 10% следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: антисептические средства.

10. Мазь салициловая 2%, 5%, 10% обладает кератолитическим, противовоспалительным и противомикробным действием, способствует очищению от гнойного секрета и заживлению пораженных участков кожи. При нанесении на кожу оказывает бактерицидное или бактериостатическое действие.

По степени воздействия на организм Мазь салициловая 2%, 5%, 10% согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Мазь салициловую 2%, 5% и 10% назначают животным в качестве антисептического средства при воспалительных заболеваниях кожи.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с Мазью салициловой 2%, 5%, 10% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью салициловой 2%, 5%, 10%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Пустые банки и тубы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения Мази салициловой 2%, 5%, 10% самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также новорожденным животным определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки соотношения пользы и возможного риска его применения.

15. Мазь салициловую 2%, 5%, 10% применяют местно, в виде аппликаций, нанося ровным тонким слоем на поврежденную поверхность и закрывают стерильной салфеткой 1-2 раза в день до выздоровления, но не более 12 суток.

Перед наложением повязки с лекарственным препаратом рану очищают от некротических масс, промывают антисептическим раствором.

Для предотвращения слизывания мази мелким животным надевают шейный воротник, либо накладывают бинтовую повязку. Следует предотвращать попадание мази на слизистые оболочки или в глаза.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мази салициловой 2%, 5%, 10% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций (зуд, покраснение, сыпь) его использование прекращают, мазь снимают марлевым тампоном с поверхности кожи и смывают водой, а животному назначают антигистаминные и другие симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Мазь салициловую 2%, 5%, 10% не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения аналогичного назначения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки, применение препарата необходимо возобновить как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Мази салициловой 2%, 5%, 10% используют без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

АО завод «Ветеринарные
препараты», 601508, Владимирская
область, г. Гусь-Хрустальный, ул.
Химзаводская, д. 2

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

АО завод «Ветеринарные
препараты», 601508, Владимирская
область, г. Гусь-Хрустальный, ул.
Химзаводская, д. 2

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по ветеринарному применению лекарственного препарата Мазь салициловая 2%, 5%, 10%, согласованная Россельхознадзором 20 марта 2018 г.