

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ  
04 ОКТ 2013

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мази стрептоцидовой для лечения ран, язв, ожогов, трещин  
сосков вымени и других хирургических патологий у животных

(Организация-разработчик ОАО завод « Ветеринарные препараты »,  
Владimirская обл., г. Гусь-Хрустальный)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь стрептоцидовая (Unguentum streptocidi)

Международное непатентованное название: стрептоцид.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь стрептоцидовая содержит в 100 г в качестве действующего вещества стрептоцид – 10 г, а в качестве вспомогательного вещества вазелин - до 100 г. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную мазь белого или светло-желтого цвета.

3. Мазь стрептоцидовую выпускают расфасованной в полимерные банки с контролем первого вскрытия или в тубы полимерные.

4. Мазь стрептоцидовую хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 10°C до 20°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Мазь стрептоцидовую следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### II. Фармакологические свойства

7. Мазь стрептоцидовая относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболеваний кожи. Мазь стрептоцидовая обладает противомикробным действием, способствует уменьшению секреции и экссудации, ускорению процессов регенерации поврежденной ткани.

По степени воздействия на организм Мазь стрептоцидовая согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

### III. Порядок применения

8. Мазь стрептоцидовую применяют для лечения ран, язв, ожогов, трещин сосков вымени и других хирургических патологий у животных.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животных к компонентам препарата.

10. Мазь стрептоцидовую применяют наружно, нанося ее тонким слоем непосредственно на поврежденную поверхность или намазывают на стерильную марлевую салфетку и прикладывают к ране 1-2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от тяжести поражения. При необходимости предварительно проводят туалет раны.

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

11. Симптомы передозировки лекарственного препарата у животных не выявлены.

12. Особенностей действия препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

13. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мази стрептоцидовой в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении признаков раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой. Дополнительного лечения не требуется.

15. Применение Мази стрептоцидовой не исключает использование других лекарственных препаратов наружного применения.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью стрептоцидовой в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мазью стрептоцидовой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью стрептоцидовой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази стрептоцидовой, утвержденная Россельхознадзором 16 апреля 2008 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения:[123-25.13-15974/ПВР-3-1.9/00162](#)