

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ  
09.08.2019

Входящ:  
№ 12/100/19  
КОПИЯ ВЕРНА



ДИРЕКТОР БЛИЗНЕЦОВА Е.Н.

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению  
лекарственного препарата Пелтамаст  
(Организация-разработчик ООО НПП «Агрофарм»; Россия,  
394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к.18)

Номер регистрационного удостоверения 15-3-3.15-3349№ПВР-3-2.0/02519

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование - Пелтамаст (Peltamastum).  
международные непатентованные наименования действующих веществ:  
неомицин и доксициклин.
2. Лекарственная форма: суспензия для интракостерального введения.  
Пелтамаст в качестве действующих веществ содержит неомицина сульфат – 6,6 мг/мл и доксициклина гидрохлорид – 19,9 мг/мл, а также вспомогательные вещества: воск эмульсионный, алюминия стеарат, магния окись, масло вазелиновое.
3. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую суспензию желтого цвета.  
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.  
Запрещается применение Пелтамаста по истечении срока годности.
4. Пелтамаст выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из оранжевого стекла, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками; по 10 мл в шприцы-дозаторы однократного использования, снабженные канюлей для интракостерального введения, закупоренные защитными колпачками. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.
5. Пелтамаст хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.  
После вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит.
6. Пелтамаст следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается Пелтамаст без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Пелтамаст относится к фармакотерапевтической группе - аминогликозиды в комбинациях.
  10. Неомицина сульфат и доксициклина гидрохлорид, входящие в состав препарата, обеспечивают широкий спектр его антимикробной активности.  
Неомицина сульфат – аминогликозидный антибиотик, эффективен в отношении ряда грамположительных (стафилококки, пневмококки) и грамотрицательных (кишечная палочка, палочка дизентерии, протей и др.) микроорганизмов. Не активен в отношении анаэробов. Механизм его действия заключается в связывании со специфическими рецепторами бактериальных рибосом и нарушением синтеза цитоплазматических мембран, приводящим к гибели бактериальных клеток.  
Доксициклина гидрохлорид – полусинтетическое производное окситетрациклина, эффективен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В основе его антибактериального действия лежит подавление белкового синтеза микробной клетки на уровне рибосом.  
Благодаря комбинированному действию доксициклина гидрохлорида и неомицина и специальной основы наблюдается пролонгированное антибактериальное действие препарата в течение 6 недель.
- Пелтамаст по степени воздействия на организм относится к веществам «малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). При интракостеральном введении в молочную железу клинически здоровых коров препарат вызывает незначительное, быстро проходящее раздражение тканей вымени.

### III. Порядок применения

11. Пелтамаст применяют с лечебно-профилактической целью при мастите коров в сухостойный период.
12. Противопоказанием к применению Пелтамаста является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

11.08.20  
Журн

В связи с выделением препарата с молоком, запрещается применение Пелтамаста дойным коровам, а также стельным коровам менее чем за 49 суток до предполагаемого отела (начала лактации).

13. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Пелтамаста следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пелтамастом. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Пелтамаст не предназначен для применения лактирующим коровам. Применение препарата коровам в период стельности разрешается не позднее чем за 49 суток до предполагаемого отела.

15. Пелтамаст вводят коровам сразу после завершения лактационного периода (после последней дойки) во все четверти вымени, однократно в дозе 10 мл в каждую четверть.

Перед введением препарата молоко из всех четвертей выдаивают, а сосок дезинфицируют 70 % раствором этилового спирта, Пелтамаст подогревают до 36 – 39 °С и взбалтывают. При использовании шприца-дозатора его канюлю плотно прижимают к отверстию соскового канала и вводят препарат. Из флакона препарат набирают стерильным шприцем и вводят в сосок при помощи стерильного катетера. После введения проводят легкий массаж вымени снизу вверх.

16. При применении Пелтамаста в соответствии с настоящей инструкцией использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

18. Не следует применять препарат совместно с другими лекарственными средствами для интраистернального введения. Информация о несовместимости Пелтамаста с препаратами в других лекарственных формах отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом назначении не установлены.

20. Пелтамаст предназначен для однократного применения.

21. После применения Пелтамаста в соответствии с настоящей инструкцией молоко в пищевых целях разрешается использовать не ранее чем через 96 часов после отела коров. В случае ошибочного применения препарата лактирующей корове или стельной корове менее чем за 49 суток до отела молоко можно использовать не ранее чем через 53 суток. Молоко, полученное из здоровых четвертей вымени до истечения установленных сроков, может быть использовано в корм животным после кипячения.

Убой коров на мясо разрешается не ранее чем через 28 суток после введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителей лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения



ООО НПП «Агрофарм», Россия,  
394087, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114-б

ООО НПП «Агрофарм», Россия,  
394033, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, ул. Витрука, д. 1 А

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий  
от потребителя

ООО НПП «Агрофарм»; Россия,  
394061, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, проспект Труда, д. 10, к. 18