

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Сурфагона
для повышения оплодотворяемости и лечения гинекологических
болезней у самок сельскохозяйственных животных
(организация-производитель ЗАО «Мосагротен», г. Москва)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Сурфагон (Surfagon).
Международное непатентованное наименование действующего вещества:
люлиберина ацетат.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Лекарственный препарат в 1 мл в качестве действующего вещества содержит
сурфагона 5 или 10 мкг, вспомогательные вещества: 9 мг хлорида натрия,
0,5 мг нипагина, а также воду для инъекций до 1 мл.

3. Препарат выпускают расфасованным по 10 или 100 мл в стеклянные фла-
коны соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укреп-
ленными алюминиевыми колпачками.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищен-
ном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов,
при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хране-
ния – 2 года с даты производства. После вскрытия флакона неиспользованные ос-
татки препарата хранению не подлежат. Запрещается применение препарата по
истечении срока годности.

5. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Утилизация неиспользованного препарата производится в соответствии с
требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Сурфагон относится к группе: гормональные средства, их аналоги и ан-
тагонисты (ATC vet code: QH01CA90).

Сурфагон является синтетическим аналогом гонадотропин-рилизинг гормо-
на (ГнРГ) - люлиберина. Конкурентно связывается с рецепторами клеток перед-
ней доли гипофиза, вызывая, как и другие аналоги ГнРГ, кратковременное повы-
шение уровня половых гормонов в крови. Повышенное содержание гонадотропи-
нов в крови сохраняется в течение 3 -4 часов после введения, затем содержание

быстро падает. Период полураспада сурфагона такой же, как и у природного люлиберина. В течение этого времени пептид распадается на аминокислоты и выводится из организма.

Сурфагон по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Сурфагон применяют для:

- ранней индукции полового цикла;
- лечения гипофункции и фолликулярных кист яичников;
- предупреждения ранней эмбриональной смертности;
- повышения оплодотворяемости самок сельскохозяйственных животных.

9. Противопоказаний для применения препарата в соответствии с инструкцией не установлено.

10. Для ранней индукции полового цикла у коров Сурфагон вводят однократно в дозе 50 мкг на 8-12 день после отёла. Несмотря на приход животных в охоту их осеменяют не ранее, чем через 60 дней после отёла.

Для лечения лёгкой формы гипофункции яичников у коров Сурфагон вводят двукратно: первый раз – на 8-12 день полового цикла в дозе 50 мкг, повторно – через 10 дней в той же дозе.

При более выраженной форме гипофункции яичников на 1, 3 и 5 день внутримышечно вводят по 10 мл 1% масляного раствора прогестерона, а на 7-ой день – Магэстрофан[®] в дозе 2 мл и Сурфагон в дозе 50 мкг. Животных осеменяют по мере прихода в охоту.

Для лечения фолликулярных кист Сурфагон вводят три раза с интервалом 24 часа коровам в дозе 20-25 мкг, телкам 15-20 мкг. Коровам можно однократно внутривенно в дозе 50 мкг. На 11-13 день после первого введения препарата вводят внутримышечно Магэстрофан[®] в дозе 2 мл. Животных осеменяют по мере прихода в охоту.

При двух и более неплодотворных осеменениях коров на 11 день после последнего прихода в охоту внутримышечно вводят Магэстрофан[®] в дозе 2 мл, а примерно через 70 часов вводят Сурфагон в дозе 50 мкг и животных осеменяют по мере прихода в охоту. Коров, не пришедших в охоту, повторно обрабатывают Сурфагоном в дозе 50 мкг. Животных, пришедших в охоту, осеменяют.

Для предупреждения ранней эмбриональной смертности у коров вводят Сурфагон на 3, 5 и 9 дни после осеменения в дозе 20-25 мкг.

Для повышения оплодотворяемости и синхронизации овуляции свиноматкам через 24-48 часов после отёма поросят вводят 600-800 МЕ Фоллимага[®]. После выявления охоты перед осеменением вводят Сурфагон в дозе 10 мкг. Осеменение свиноматок проводят согласно инструкции.

Для стимуляции развития репродуктивных органов ремонтных свинок за 60 и 30 дней до планового осеменения использовать Сурфагон по 10 мкг или Пигуллин* по 1 дозе на животное.

* - Пигуллин содержит в 1 дозе препарата гонадотропин сыворотки крови жеребых коров (400 МЕ фолликулостимулирующей активности, ФСГ) и хорионический гонадотропин человека (200 МЕ* лютеинизирующей активности, ЛГ).

Для повышения оплодотворяемости овцематок препарат вводят однократно в дозе 15-20 мкг. Искусственное осеменение проводят через 12-14 часов. Через 12 часов животных повторно осеменяют.

11. Случаев передозировки Сурфагоном не отмечено.

12. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Предусмотрено однократное введение препарата.

14. При применении Сурфагона в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

15. Сурфагон не разрешается смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

16. Молоко и мясо животных, обработанных сурфагоном, используют в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Сурфагоном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Мосагроген», 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению препарата Сурфагон, утвержденная Россельхознадзором 03.03.2008 г.

Инструкция разработана ЗАО «Мосагроген», 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».