



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата ФЛАЙБЛОК®

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-8.18-4196 НТВР-3-36.12/02895

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения
торговое наименование: ФЛАЙБЛОК® (Flyblok);
международное непатентованное наименование: цифлутрин.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
ФЛАЙБЛОК® в качестве действующего вещества содержит цифлутрин –
10мг/мл и вспомогательные вещества: сольвессо, эфирное масло цитронеллы
(отдушка) и парафин.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой
маслянистую жидкость от бесцветного до желтого цвета с приятным запахом, при
хранении допускается опалесценция.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения
в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства. Срок годности
препарата после первого вскрытия флакона-капельницы, флакона, бутылки или
канистры – 6 месяцев, после вскрытия пипетки-капельницы препарат хранению не
подлежит. Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока
годности.
4. Выпускают препарат в емкостях из полимерного материала,
расфасованным: по 5 мл в пипетки-капельницы, по 10 мл и 20 мл во
флаконы-капельницы, по 60, 100 и 500 мл во флаконы, по 1 л в бутылки, по 2,5 л и 5
л в канистры. Флаконы, флаконы-капельницы, бутылки или канистры с препаратом
укупоривают навинчиваемыми полимерными крышками. Допускается выпускать
флаконы, бутылки и канистры в комплекте с дозатором. Пипетки-капельницы по 2, 5
и 10 штук, флаконы по 60 и 100 мл и флаконы-капельницы поштучно упаковывают в
картонную пачку. Каждая потребительская упаковка сопровождается инструкцией
по применению препарата.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°C до 25°C.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. ФЛАЙБЛОК® относится к инсектицидным препаратам группы синтетических пиретроидов.

10. Цифлутрин (циано-4-(флуоро-3-феноксифенил)-метил-3(2,2-дихлоро-этилен)-2,2-диметил), входящий в состав препарата, обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении двукрылых насекомых, в том числе слепней (*Tabanidae*), оводов (*Hypodermatidae*), комаров (*Culicidae*), мошек (*Simuliidae*) и зоофильных мух, включая *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*.

После нанесения на кожу препарат, практически не всасываясь, распределяется по поверхности тела животного, что обеспечивает его длительное инсектицидное и репеллентное действие.

Механизм инсектицидного действия цифлутрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых.

ФЛАЙБЛОК® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемой дозе хорошо переносится животными, не оказывает резорбтивно-токсического и раздражающего действия на кожу; при попадании на слизистые вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для пчел, а так же рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. ФЛАЙБЛОК® применяют для защиты крупного рогатого скота, спортивных и гужевых лошадей в пастбищный период от нападения двукрылых насекомых – слепней, оводов, комаров, мошек и зоофильных мух.

12. Противопоказанием к применению ФЛАЙБЛОК® является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Препарат не следует применять подсосным телятам и жеребятam, а также наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу.

13. При работе с препаратом ФЛАЙБЛОК® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Обработку животных следует проводить в спецодежде (халат, головной убор, резиновые сапоги, гигиенические перчатки). При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками

глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ФЛАЙБЛОК®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Противопоказаний и особенностей применения препарата самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. ФЛАЙБЛОК® наносят на сухую неповрежденную кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца однократно в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту 0,3 мл на 10 кг массы животного;
- лошадям 0,4 мл на 10 кг массы животного.

С учетом массы и вида обрабатываемого животного выбирают фасовку необходимого объема.

Вид и масса животного	Доза препарата, мл/10 кг массы животного	Доза препарата в мл / кол-во пипеток-капельниц
Крупный рогатый скот		
от 300 кг до 400 кг	0,3	10,0 / 2 пипетки
от 400 кг до 500 кг		15,0 / 3 пипетки
Лошади		
от 300 кг до 400 кг	0,4	15,0 / 3 пипетки
от 400 кг до 500 кг		20,0 / 4 пипетки
от 500 кг до 600 кг		25,0 / 5 пипеток

Защитное действие препарата начинается через 3-4 часа после обработки и продолжается до 28 суток.

В период активного лета насекомых для более выраженного эффекта рекомендуется одновременная обработка всех животных стада с интервалом 3-4 недели. Дойных коров обрабатывают сразу после дойки.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата ФЛАЙБЛОК® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и проявлении аллергических реакций препарат смывают водой с мылом и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние и снижение аппетита.

18 ФЛАЙБЛОК® не следует применять одновременно с другими инсектицидными средствами для обработки животных.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. При проведении обработок следует придерживаться рекомендуемого инструкцией интервала. При пропуске очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Продукция животного происхождения после применения препарата в соответствии с настоящей инструкцией может быть использована без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г.о.
Сергиево-Посадский, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г.о.
Сергиево-Посадский, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д. 1/11.
Телефон круглосуточной «Горячей
линии»: 8-800-700-19-93. Информация
о лекарственном препарате размещена
на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор
ООО «НВЦ Агроветзащита»



С.В. Енгашев