



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
ветеринарного контроля
и надзора МСХ РК


«27» 05 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению
лекарственного препарата Фоллимаг[®] раствор

Организация-разработчик: АО «Мосагроген»
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д.1, стр.1, пом. IV эт.1 ком 6.

I. Общие положения

Торговое наименование лекарственного препарата: Фоллимаг[®] раствор (Follimag solutio).

Международное непатентованное наименование: гонадотропин сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК).

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Лекарственный препарат в 1 мл содержит в качестве действующего вещества гонадотропин сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) – 200 международных единиц (МЕ) и вспомогательные вещества: полисорбат 80, динатрия эдетат, цитрат натрия 2-х водный, пропиленгликоль, макроголглицерол рицинолеат, бензетония хлорид, воду для инъекций.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость.

Фоллимаг[®] раствор выпускают расфасованным по 10, 20 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, закупоренными резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы помещают в картонные коробки по 20 штук. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.



Этикетирование и маркировка. На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги писчей или бумаги этикеточной. Текст этикеток соответствует требованиям законодательства.

Хранение и транспортировка. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства; после вскрытия упаковки неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается использование препарата после окончания срока его годности.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 10 °С.

Фоллимаг[®] раствор следует хранить в недоступном для детей месте.

Препарат транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, при температуре от 2 °С до 10°С.

Методы уничтожение неиспользованного/недоиспользованного препарата.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Краткая характеристика.

Фоллимаг[®] раствор относится к фармакологической группе гормоны и их антагонисты.

Лекарственный препарат предназначен для разового применения.

Препарат содержит гонадотропный гормон сыворотки крови жеребых кобыл (ГСЖК), очищенный от иммуногенных белков. ГСЖК обладает как фолликулостимулирующей, так и лютеинизирующей активностью и не обладает межвидовой специфичностью. Фоллимаг[®] раствор стимулирует рост и развитие фолликулов у самок сельскохозяйственных животных, а у самцов усиливает функцию интерстициальных клеток в семенниках, синтез тестостерона и, как следствие, повышение сперматогенеза и половой активности.

Фоллимаг[®] раствор по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

Фоллимаг[®] раствор отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Порядок применения ветеринарного препарата

Подготовительные процедуры перед использованием препарата.

Перед использованием следует ознакомиться с настоящей инструкцией по применению ветеринарного препарата. Назначать и применять его имеет право дипломированный специалист ветеринарной медицины.



При работе с препаратом Фоллимаг® раствор следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Фоллимаг® раствор. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается применение лекарственного препарата ослабленным животным и не достигшим половой зрелости.

Запрещается применение препарата беременным животным. Лактирующим животным возможно применение препарата без ограничений.

Не рекомендуется смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами. Применение препарата Фоллимаг® раствор не исключает использования других лекарственных препаратов.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

Процедура применения ветеринарного препарата.

Для стимуляции половой охоты и повышения плодовитости препарат вводят однократно:

- коровам внутримышечно в область крупа в дозах 500-1000 МЕ/животное (2,5-5 мл). В случае отсутствия проявления четко выраженной половой охоты или неплотного осеменения, препарат следует применить повторно в той же дозе через 21-23 дня после предварительного гинекологического обследования животных;

- свиноматкам внутримышечно в дозе 800-1000 МЕ/животное (4-5 мл) через 24 часа после отъема поросят;

- пушным зверям в период гона подкожно с внутренней стороны бедра в дозе 50-60 МЕ/животное (0,25-0,30 мл). Лисицам и песцам до 200 МЕ/животное (до 1 мл).

Для лечения гипофункции яичников у коров Фоллимаг® раствор применяют внутримышечно в дозе 900-1000 МЕ/животное (4,5-5 мл).

С целью проведения суперовуляции у коров применяют внутримышечно в дозе 1500-3000 МЕ/животное (7,5-15 мл).



Овцам для индукции и синхронизации овуляции в дозе 400-500 МЕ/животное (2-2,5 мл). Для увеличения приплода вводят внутримышечно 700-800 МЕ/животное (3,5-4,0 мл).

С целью повышения половой активности баранов и хряков препарат вводят подкожно с внутренней стороны бедра двукратно с интервалом 3-4 дня в дозе 600-800 МЕ/животное (3-4 мл) и 1000-1200 МЕ/животное (5-6 мл), соответственно.

Показания для вынужденного применения ветеринарного препарата.

Фоллимаг[®] раствор применяют для стимуляции половой охоты у сельскохозяйственных животных, пушных зверей и лечения гипофункции яичников у коров.

Содержание и использование животных после применения ветеринарного препарата, включая период до следующей обработки животных другими ветеринарными препаратами.

Специальные мероприятия отсутствуют.

Сроки наступления иммунитета и его длительности при разных способах применения ветеринарного препарата.

Не применимо.

Реакция животных на ветеринарный препарат, включая реакцию в месте введения ветеринарного препарата и общей температурной и клинической реакций животного, а также их интенсивность и длительность.

При применении препарата Фоллимаг[®] раствор в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае проявления признаков анафилактической реакции животным немедленно вводят адренолитические и/или антигистаминные препараты в соответствии с инструкциями по их применению.

Меры предотвращения возможных осложнений в результате применения ветеринарного препарата (включая причину осложнений, их вид, интенсивность и длительность).

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Использование сырья и продукции от животных, на которых применялся ветеринарный препарат (с указанием вида сырья и продукции и периода их использования после применения ветеринарного препарата).

Продукцию животноводства после применения препарата Фоллимаг[®] раствор в пищевых целях можно использовать без ограничений.

Учет реакции на ветеринарный препарат, процедуры определения причин возникновения осложнений у животных после применения



ветеринарного препарата или его неэффективности и порядка оформления рекламаций.

В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545, г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-ый, д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1 ком 6.
т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген»



И.А. Казакова